

唵引曩謨囉引縛拏引野一怛哩合布囉二

尾曩引舍曩引野三能瑟吒囉引三合怛迦合

囉囉四婆引酥囉引野五贊捺囉合賀細曩

六賀曩賀曩七摩哩那合二摩哩那八合難尼

曩九尾捺囉引二合鉢野十尾捺囉合鉢野十一

塞健合馱二十捫左捫左三十俱摩囉岡叶叶叶

十五發吒音發吒音娑縛引二合賀六引十

如是誦大明加持已出於城外以戌時從於
東方旋轉四方祭塞健馱母鬼所有祭食及
種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥爾

時羅縛拏說是救療小兒疾病經已歡喜而
退

羅縛拏說救療小兒疾病經

迦葉仙人說醫女人經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時唵縛迦仙人忽作是念世間衆生皆從
女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十
月或復延胎至十二月方始產生或於中間

有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時吟嘽迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者苦惱無量我師大智願爲宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住爾時迦葉仙人告吟嘽迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏

得不安隱我今爲汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香蓮華優鉢羅華入水同研後入乳汁乳糖同煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復次告吟嘽迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色優鉢羅華俱母那華根菱角仁羯細嚕迦等藥諸藥等分搗篩爲末用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱隸藥叱羅迦俱隸藥及蔴根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用蔴草根并枝葉等優鉢羅華并及莖幹等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用瓠子根及優鉢羅華各用等分搗篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第六月胎藏不安者當用閉阿羅藥子摩地迦羅惹藥薩訖多嚩藥各用等分以水相和研令極細復入乳汁同煎後入乳糖及蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安者當用

蒺藜草枝葉并根搗篩爲末用乳糖及蜜爲丸用肉汁服之復以肉汁餐飯食之或食菜豆粥飯比藥及飯能安胎藏患者服食而得安樂

復次女人懷孕至第八月胎藏不安者當用

凡七

三銓識藥蓮華青優鉢羅華十八蒺藜草各等分

以冷水相和研令極細後入乳汁及糖蜜等

同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第九月胎藏不安者當用

蒺藜草枝葉并根搗篩爲末用乳糖及蜜爲丸用肉汁服之復以肉汁餐飯食之或食菜豆粥飯比藥及飯能安胎藏患者服食而得安樂

蔴根迦俱隸藥舍羅鉢蔽尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相和研令極細入乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第十月胎藏不安者當用

菜豆優鉢羅華等分以水相和研令極細復

入乳糖及蜜并乳汁同煎候冷服之此藥能

安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者當

用青優鉢羅華娑路剛藥蓮華并莖等分以

冷水相和研令極細後入乳汁乳糖同煎候
冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之
而得安樂

復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者
當用迦俱隸藥吒囉迦俱隸藥甘草優鉢羅

臨七

廿九

華各等分搗篩令細以水同研後入乳汁相
和煎熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛
患者服之而得安樂爾時吟縛迦仙人聞師
說是女人懷孕保養法已歡喜信受作禮而
退

迦葉仙人說醫女人經

音釋

痔瘻

痔丈爾切瘻音陋

漏瘡也

瘰癧

瘰郎果切癧音歷

華莢

筋結

駭語駭切

喻

與迄及切

莢

華莢音華

必莢

音鉢

切